

2M

FORMOL



Fórmula:
FORMALDEHIDO 37%

Vehículo:
Agua desmineralizada C.S.P. 100 ml

Indicaciones:
Se indica para la prevención y tratamiento del piéтин y patologías de las pezuñas, como antiséptico y desinfectante para ser usado mediante aplicación externa en forma local en Bovinos, Ovinos y Caprinos. Agentes etiológicos susceptibles: Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus, Sphaerophorus necrophorus, Spiroquetas no identificadas, Bacterioides melaninogenicus, Levaduras spp. Spirochaeta penortha, Corinebacterium piógenes, Dermatophilus congolensis, Escherichia coli, Nocercia spp., Bacillus anthracis, Micobacterias, Salmolnelas spp., Erysipelotrix rhusiopathiae, Virus, Hongos.

Precauciones de uso:

- Mantener el envase cerrado cuando no se usa.
- En casos graves con gran cantidad de animales afectados y una alta prevalencia de cojeras se utiliza el producto terapéuticamente al 20% durante 7 días.

Vía de administración y dosis:
En pediluvios, dosis entre 5 y 10% en solución acuosa.

Precauciones de seguridad personal
En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al Médico en el centro de salud más cercano.

Centros toxicológicos de importancia en el país:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4664-6648/4658-7777 Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños R. Gutierrez: 011-4962-6666/4962-2247 Hospital de Niños - La Plata: 0241-451-5555 Hospital de Niños - Córdoba: 0351-445303 Hospital Santa Roso - Córdoba: 0351-422048/422046 Sanatorio de Niños - Rosario: 0341-4240054/4241010

Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario.
Conservar entre 0°C y 30°C - No exponer al sol.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS AGITAR ANTES DE USAR